

Konvertera från IVIG till Hizentra

Hizentra är indicerat för underhållsbehandling av patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) efter stabilisering med IVIg.

Behandling med Hizentra påbörjas 1 vecka efter den sista infusionen IVIg.

Rekommenderad subkutan dos är 0,2 till 0,4 g/kg (1 ml till 2 ml/kg) kroppsvikt per vecka

– Den initiala dosen kan ha en 1:1-konversion mot den tidigare IVIg-dosen (beräknad som veckodos).

– Veckodosen kan fördelas i mindre doser och administreras efter önskat antal gånger per vecka; för dosering varannan vecka ska veckodosen av Hizentra dubblas.

Dosen kan behöva anpassas för att uppnå önskad klinisk respons. Patientens individuella kliniska respons ska vara den främsta faktorn vid dosjustering. Vid eventuell klinisk försämring kan dosen ökas till den rekommenderade maximala veckodosen 0,4 g/kg.

Dos i gram för IVIG

80 gram

Rekommenderad underhållsdos IVIG 1 g/kg kroppsvikt var tredje vecka.

Administrationfrekvens IVIG

Var 3 vecka

Veckodos Hizentra

27 gram

Kan delas upp på flera infusionsställen.

133 ml

Maximal volym per infusionsställe är 50 ml.


Hizentra
Humant normalt immunglobulin (SC) 20% lösning

Hizentrados baserat på kroppsvikt

Hizentra är indicerat för underhållsbehandling av patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) efter stabilisering med IVIg.

Behandling med Hizentra påbörjas 1 vecka efter den sista infusionen IVIg.

Rekommenderad subkutan dos är 0,2 till 0,4 g/kg (1 ml till 2 ml/kg) kroppsvikt per vecka

– Den initiala dosen kan ha en 1:1-konversion mot den tidigare IVIg-dosen (beräknad som veckodos).

– Veckodosen kan fördelas i mindre doser och administreras efter önskat antal gånger per vecka; för dosering varannan vecka ska veckodosen av Hizentra dubblas.

Dosen kan behöva anpassas för att uppnå önskad klinisk respons. Patientens individuella kliniska respons ska vara den främsta faktorn vid dosjustering. Vid eventuell klinisk försämring kan dosen ökas till den rekommenderade maximala veckodosen 0,4 g/kg.

Patients kroppsvikt	80 kg
Subkutan dos	0.4 g/kg
Veckodos Hizentra Kan delas upp på flera infusionsställen. Maximal volym per infusionsställe är 50 ml.	32 gram 160 ml


Hizentra
Humant normalt immunglobulin (SCIG) 20% lösning

SPC

Hizentra[®] (Humant normalt immunglobulin (SCIg)) 200 mg/ml injektionsvätska för subkutan injektion, lösning. Rx, F, J06BA01. **Indikation:** Substitutionsterapi hos vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid primära immunbristsyndrom eller sekundär immunbrist (SID) hos patienter som lider av svåra eller återkommande infektioner, ineffektiv antimikrobiell behandling och som antingen har en konstaterad specifik antikroppsbrist (PSAF, proven specific antibody failure) eller en IgG-nivå i serum på < 4 g/l. Immunomodulerande terapi hos vuxna, barn och ungdomar (0-18 år) som underhållsbehandling av patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP). **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med hyperprolinemi typ I eller II. Hizentra får inte ges intravaskulärt. **Förpackningsstorlekar:** 5 ml (1 g), 10 ml (2 g), 20 ml (4 g), 50 ml (10 g) samt 10 × 10 ml (10 × 2 g). Förvaring i rumstemperatur under hela hållbarhetstiden. Datum för översyn av produktresumén: 11/2021. **För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se.**